

第3類医薬品

錠剤
便秘治療薬
ミルマグ
LX

LAXATIVE
TABLET MILMAG LX
240錠

エムジーファーマ株式会社
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-25
お客様相談窓口 072-643-1117

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり 副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、
他の瀉下剤(下剤)を服用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人
(4) 腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、はげしい腹痛、吐き気・嘔吐があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 服用後、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

次の量を就寝前(又は空腹時)に服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2~6錠	1回
11歳~14歳	1~4錠	
7歳~10歳	1~3錠	
5歳~6歳	1~2錠	
5歳未満	服用しないこと	

服用の際には、コップ1~2杯の水と共に服用し、なるべく水分を多く摂取するとより効果的です。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (3) 本剤は5歳未満の乳幼児に服用させないこと

【販売名】錠剤ミルマグLX

【成分】1錠中
水酸化マグネシウム 0.35g含有
添加物としてトウモロコシデンプン、白糖、タルク、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 錠剤が軟らかいので割れることがある
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- (6) 瓶の中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用である。開封後は不要となるので捨てること
- (7) 服用のつど瓶のフタをしっかりしめること



使用期限
製造番号